


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	2
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	5
5.4. Revues des indications	5
6. Etudes cliniques et expérimentales	5

22VB Yuanye 渊液 (淵液)

prononciation 🗣️ [yuanye.mp3](#)

articles connexes: - 21VB - 23VB - [Méridien](#)



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

渊液	Liquide profond (Nguyen Van Nghi 1971)
Yuānyè	Abîme de l'aisselle (Pan 1993)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *yuan* see Taiyuan (9P). *ye* armpit.
- *Yuan* : abîme (Pan 1993) ; (Ricci 5984) : eau profonde, abîme, profond (Guillaume 1995).
- *Ye* : aisselle (Pan 1993) ; (Ricci 5700) : aisselle (Guillaume 1995).

1.2. Origine

- Guillaume 1995 : Ling shu, chapitre des « Furoncles ».

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Yuanye* The point is hidden deeply in the armpit.
- Pan 1993 : l'aisselle est comparée à un abîme, d'où le nom donné à ce point qui se trouve au-dessous de l'aisselle.

1.4. Noms secondaires

Yuānyè 淵液 [淵液] (1)	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Quányè 泉液 (2)	Qian jin yao fang (Guillaume 1995)
Yèmén 腋門 [腋門] (3) : (en fait, il s'agit du nom d'un point hors méridien, ou d'un nom secondaire de <i>Da ju</i> - 27E)	Guillaume 1995

1. *Yuan* (Ricci 5984) ; *Ye* (Ricci 5696) : liquide, jus, sécrétion.
2. *Quan* (Ricci 1386) : source, fontaine, monnaie ; *Ye* (Ricci 5696)
3. *Ye* (Ricci 5700) : aisselle ; *Men* (Ricci 3426) : porte, ouverture, voie.

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A trois distances au-dessous du creux axillaire dans un grand creux au 4ème espace intercostal.
- Roustan 1979 : A trois distances au-dessous de la ligne médiane axillaire, dans le cinquième espace intercostal.
- Deng 1993 : sur le côté de la poitrine, sur la ligne médiane axillaire quand le bras est levé, à 3 *cun* au-dessous de l'aisselle, dans le quatrième espace intercostal.
- Pan 1993 : se trouve sur la ligne axillaire, dans le quatrième ou le cinquième espace intercostal selon les auteurs, à 3 distances sous le pli de l'aisselle.
- Guillaume 1995 : à 3 distances au-dessous de l'aisselle, sur la ligne médio-axillaire, dans le quatrième espace intercostal.
- WHO 2009: In the lateral thoracic region, in the fourth intercostal space, on the midaxillary line.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : “Dans la dépression située à 3 *cun* au-dessous de l'aisselle. Le point est localisé lorsque le bras est levé” (Jia Yi). Remarque : tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point. Actuellement, on situe *Yuanye* (22VB) sur le côté de la poitrine, sur la ligne médiane axillaire lorsque le bras est levé, à 3 *cun* au-dessous de l'aisselle, dans le quatrième espace intercostal.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Artère thoracique dorsale, veine thoraco-épigastrique, artère et veine du cinquième espace intercostal. Rameau perforant latéral du quatrième nerf intercostal, nerf du grand dentelé.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

* Nguyen Van Nghi 1971 : Point d'entrée des méridiens distincts du cœur, du maître du cœur et des poumons.

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Yuan ye* élargit le thorax, favorise la circulation du *Qi*, relâche les tendons, vivifie les *Luo*, élimine les enflures et calme les douleurs.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Ming tang, puncturer à 0,3 distance	Selon Tong ren, les moxas sont interdits, la moxibustion peut provoquer une enflure avec ulcération des ganglions ; si l'ulcération se creuse vers l'intérieur, c'est la mort	Zhen jiu ju ying, Da cheng, Lei jing tu yi (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-0,8 distance	Chauffer 3-5 minutes	Roustan 1979
Puncture inclinée ou tangentielle entre 0,5 et 0,8 distance de profondeur, il ne faut pas puncturer profondément	Cautérisation pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995

- Guillaume 1995 : selon le Jia yi jing, il ne faut pas faire de moxa, car il y a un risque de blessure des ganglions superficiels et d'ulcération. Selon le Yi xue ru men, il ne faut ni puncturer ni faire

de moxa.

Sensation de puncture

Sécurité

- Roustan 1979 : Il est interdit de piquer profondément.
- Ma YC, Peng CT, Huang YC, Lin HY, Lin JG. The Depths From Skin To The Major Organs At Chest Acupoints Of Pediatric Patients. Evid Based Complement Alternat Med.2015. [184252]

Background. Acupuncture is applied to treat numerous diseases in pediatric patients. Few reports have been published on the depth to which it is safe to insert needle acupoints in pediatric patients. We evaluated the depths to which acupuncture needles can be inserted safely in chest acupoints in pediatric patients and the variations in safe depth according to sex, age, body weight, and body mass index (BMI). Methods. We retrospectively studied computed tomography (CT) images of pediatric patients aged 4 to 18 years who had undergone chest CT at China Medical University Hospital from December 2004 to May 2013. The safe depth of chest acupoints was directly measured from the CT images. The relationships between the safe depth of these acupoints and sex, age, body weight, and BMI were analyzed. Results. The results demonstrated significant differences in depth among boys and girls at KI25 (kidney meridian), ST16 (stomach meridian), ST18, SP17 (spleen meridian), SP19, SP20, PC1 (pericardium meridian), LU2 (lung meridian), and GB22 (gallbladder meridian). Safe depth significantly differed among the age groups ($P < 0.001$), weight groups ($P < 0.05$), and BMI groups ($P < 0.05$). Conclusion. Physicians should focus on large variations in needle depth during acupuncture for achieving optimal therapeutic effect and preventing complications.

5. Indications

Classe d'usage	- point secondaire
----------------	--------------------

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : pathologie pleurale, névralgies intestinales.
- Roustan 1979 : Pleurésie, névralgie intercostale, affections des ganglions lymphatiques de l'aisselle, douleur scapulaire.
- Guillaume 1995 : Douleur thoracique et costale, enflure sous axillaire, douleur de l'épaule et du bras ; adénites axillaires tuberculeuses, névralgie intercostale.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Plénitude du thorax-*xiong man* avec présence de ganglions, impossibilité de lever le bras » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Plénitude thoracique ; furoncle rouge et dur qui n'est pas encore mûr ; impossibilité de lever le bras (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : frissons et fièvre au cours des ulcérations des ganglions axillaires » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Accès de frissons et de fièvre, ulcération des ganglions axillaires, plénitude du thorax, absence de force, impossibilité de lever le bras. Il ne convient pas de pratiquer des moxas, la moxibustion pouvant entraîner une enflure et une ulcération des ganglions ; si l'ulcération est interne, il y a un risque mortel ; s'il y a frissons et fièvre, le malade peut survivre » (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Rougeur et douleur des flancs et des côtes » (Guillaume 1995).

- Lei jing tu yi : « Accès de frissons et de fièvre avec adénopathies fistulisées, plénitude du thorax avec absence de force, impossibilité de lever le bras » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Enflure et fistulisation des ganglions	22VB + 13F + 6TR	Jia yi jing (Guillaume 1995)
Hypertrophie des ganglions sous-axillaires	22VB + 6TR + 5TR + 41VB	Lei jing tu yi (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

From:
<https://ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:
<https://ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:22vb>

Last update: **03 Feb 2022 14:48**